

Diffère des genres *Stizus*, *Sphécus*, *Kohlia* et *Handlirschia* par son tibia médian à un seul éperon, de *Stizus* par son segment ventral 8 à une seule épine, de *Sphécus* par la nervulation alaire.

Omphalius niger ♂ nov. sp.? — *Niger*, labro, antennarum articulo ultimo pedibusque anticis plus minus dilute rufescentibus. Alae nigrae aureo-viridi nitentes. — Long. 18-19 mill., al. 14 mill.

Le labre et le chaperon frès éparsément ponctués; l'écu nasal lisse, mat; le scape un peu en olive, presque aussi long que l'art. 3; le front avec une fine carène remontant du niveau des antennes assez près de l'ocelle impair avant lequel elle émet trois branches, la centrale un peu obsolète et presque horizontale s'avance plus près de l'ocelle, les latérales déterminant deux carènes obliquement transversales.

Le dos du tronc à ponctuation moyenne régulière; la face postérieure du segment médiaire et la base du segment 4 à poils courts, dressés, noirs.

1 ♂ de Batah (7-IX-97), recueilli par M. l'ingénieur J. Bouyssou.

Est probablement le ♂ de *Stizus niger* Rad. (*Journ. Ac. Lish.*, 1881).

III. — *Prosopis* NOUVELLES DE L'AFRIQUE ÉQUATORIALE OCCIDENTALE.

On ne possédait jusqu'ici aucune *Prosopis* de cette région. M. l'ingénieur agronome J. Bouyssou en a rapporté des exemplaires de 3 espèces.

1. — **Prosopis Bouyssoui** ♀ n. sp. — *Nigra*, vir flavo-picta, glabra, capite parvo, deorsum angustato et trunco punctato-scabris, segmentis 2 et sequentibus fere laevibus; mesonoto antice marginato, metanoto (postscutello) medio longitudinaliter impresso; segmenti medialis areis dorsalibus reticulatis, angulis laterali-posticis valde marginatis. Alae vitreae, nervis nigris.

Long. 5,5-6 mill.

♀ Pronoti acuti linea interrupta, obscure sulphurea; segmento 1 tenuissime punctulato.

♂ Pronoti acuti linea interrupta, linea brevi juxta superum clypei et inferum senti nasalis latum lineaque anteriore tibiae 1 et ejus protarsi obscure sulphureis. Metanoti (postscutelli) impressionis lateribus retro in spinam triangularem productis (fere sicut in Catalaunco re-

ticulato Sm. (*Journ. Linn. Soc.*, II, 1857, p. 81, tab. II, n° 8); *segmento 1 crasse dense punctato*.

2 ♀ de N'Doro (15-IX et 12-XI-98); 1 ♂ de N'Doro (30-IX-98).

2. — **Prosopis Gaullei** ♀ n. sp. — *Nigra, calli humeralis apice tantum flavo; sutura pronoti in medio acuti brevissime segmentique medialis dorso griseo-tomentosis. Caput latum, vix deorsum angustatum, vix punctatum; clypeo sulculis longit. binis, scuto nasali triangulari, fere ad ocellum imparem prolato et sulcolato; metanoto (postscutello) tuberculis minutis binis transverse positis; mesosterno tenuiter marginato; thorace sat fortiter punctato; segmenti medialis spatii cordiformi clathrato-rugoso, ejus caeteris arcibus fere insculptis linea elevata discretis; segmento 1 lucido, vix tenuiter punctulato, utrinque vix fimbriato, sequentibus fere laevibus. Alae hyalinae, nervis piceis.*

Long. 7 mill.

1 ♀ du Mouny (print. 1898). Dédicée à mon excellent collègue M. Jules de Gaulle.

3. — **Prosopis gabonica** ♀ n. sp. — *Nigra, macula orbitali tantum sordide flava, funiculo subtus rufescente; caput et truncus punctata; collari crasso, antice marginato; abdomen laeve, segmentis ejus saltem basalibus utrinque molli pluma fimbriatis; area spiraculifera ab area postica vix modico jugo discreta, insculpta, spatii cordiformi rugoso; mesopleuris densius quam mesonoto punctatis. Alae infuscatae.*

Long. 4.5 mill.

Variétés : a *Tegulis scariosis*;

b *Abdominis basi brunneo rufescente*.

1 ♀ du Mouny (print. 1898); 3 ♀ de Batah (5-IX-97); 1 ♀ de N'Doro (14-XI-98).

IV. — QUELQUES AUTRES *Prosopis*.

1. — **Prosopis Pici** ♂ n. sp. — *Nigra; flava sunt clypeus, linea orbitalis, scapi trapezium dimidium anticum, linea anterior tibiae 1, apices duo tibiaram posteriorum, tarsi omnes et toti, hi vix apice rufescentes; antennarum artic. 4-10 saltem subtus pallescentibus. Caput haud longius quam supra antennis latius, deorsum angustatum, facie utrinque late sulcata, scuto nasali ab antennis ad clypeum carinato et hujus longitudinem aequante. Subtilissime punctata; spatii cordiformis*